


# IMPFUPDATE

Name/Vorn. Datum Destination(en) Geb.dat <b>Grundimpfungen</b>	 <b>Impfempfehlung            Bundesamt Bern</b>	<b>Abkürzung            Impfstoffe</b>	<b>Anzahl            Impfdosen            gemäss            Impf-            büchlein</b>	<b>Impf-            empfeh-            lung            ja / nein</b>	<b>wirksam            bis</b>
<b>Kinderlähmung</b> Poliomyelitis IPV  <b>Poliorix</b>  <b>Revaxis,</b> Boostrix-Polio Infanrix-IPV Tetravac Pentavac  früher Tropfen Impfstoffe OPV Poloral Polio Salk Trivalent	(3) - 4x ( bis 5 ) Dosen Bei Reisen in (afrik.) Länder alle 10 J	IPV  dT IPV dTp IPV DTPa IPV HiB  OPV			
<b>DTP</b> Diphtherie - Tetanus (Starrkrampf) - Pertussis (Keuchhusten) - HiB Häm.inf.B  Infanrix-IPV (HiB) Tetravac Boostrix (Td pur)  Revaxis (Tetanol) Pentavac	2. Mon 4. Mon. 12. M  4-7 Jahre  11 – 15 Jahre   25 Jahre   45 J  65 J >65y alle 10 J	DTPa IPV (HiB) <b>dTpa</b> dT  <b>dT IPV (T)</b> <b>DTPa IPV HiB</b>			
<b>MMR</b> Masern Mumps Röteln-II Priorix MMR-Vax Pro Moraten Measles Vaccine Erevax	Für nach 1963 geborene Personen: <b>2 Dosen</b> von Ma+ Mu +Rö ab 9. Mon/ 12. Mon	<b>Ma</b> <b>Mu</b> <b>Rö</b>			
<b>Hepatitis B</b> <b>Engerix B-20</b> Vax pro10  Infanrix Hexa <a href="https://osir.ch/hepatitisb/">https://osir.ch/hepatitisb/</a>	bis 16.Geb.tag 2 Dosen <small>(0/6-12Mon.)</small> ab 16.Geb.tag 3 Dosen <small>(0/1/6 Mon)</small>  2. Mon- 3.Geb.tag : 3 Dosen	<b>HBV</b>  DTPaIPVHiB <b>HBV</b>			
<b>FSME</b> Zeckenhirnhautentzündung EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.jun  <a href="https://osir.ch/zecken/">https://osir.ch/zecken/</a>	<b>3 Dosen</b> ab 12.Geb.tag / 1.-12.Geb.tag ab 16.Geb.tag 3x / 1.-16.-Geb.tag dann Booster alle 10y	<b>FSME</b>			
<b>HPV</b> human papilloma virus Gardasil 9 Cervarix	11.-15.Geb.tag 2 Dosen 0   6 Mon. 15.- 27.Geb.tag 3 Dosen 0  1-2 Mon.  6 Mon	<b>HPV</b>			
<b>Varizellen (Windpocken)</b> Varilrix Varivax Priorix Tetra	ab 12 Mon. 2x 11y -39y 2x	<b>VZV</b>			

		<b>Impfempfehlung Bundesamt Bern</b>	<b>Abkürzung Impfstoffe</b>	<b>Anzahl Impfdosen Impfbüchlein</b>	<b>Impf- empfehlung ja / nein</b>	<b>wirksam bis</b>
<b>Meningitis (Hirnhautentzündung) durch Bakterien</b>	Menveo	<i>ab 2. Geb.tag-6.Geb.tag ab 12.Geb.tag -20Geb.Tag</i>	<b>Men ACWY</b>			
(Meningitis C)	Menjugate, Meningetec Neis Vacc	12-15Mon (-5y) 11-15y (-19y)	<b>MCV C</b>			
Pneumokokken	Prevenar 13	2-12Mon.(-5y) 2Mon 4Mon 12Mon bis 5y; Adulte: in spez. Situat.	<b>PCV</b>			

## REISEIMPFUNGEN

<b>Gelbfieber</b> <i>Stamaril Arilvax (gelbes Impfbüchlein international) gewisse Länder in Afrika/Südamerika <a href="http://osir.ch/gelbfieber/">http://osir.ch/gelbfieber/</a></i>		<i>ab 9 Mon. 1x (max. 2 Dosen)</i>	<b>YF</b>			
<b>Hepatitis A</b> <i>Havrix 1440 Havrix 720</i>		<i>ab 19.Geb.tag 2x1440 E (0/6-Mon.) 1.-19. Geb.tag 2x 720 (0/6Mon.)</i>	<b>HAV</b>			
<b>Hepatitis A+B</b> <i>Twinrix 720/20</i>  <a href="https://osir.ch/kas_havrtwinrix/">https://osir.ch/kas_havrtwinrix/</a>		<i>1.- 16. Geb.tag 2x 0/6-12Mon Ab 16. Geb.tag 3 x 0/1/ 6Mon.</i>	<b>HAV+ HBV</b>			
<b>Typhus</b> <i>Vivotif</i>		<i>Tag 1, 3, 5 je1 Kps,</i>	<b>Typh</b>			
<b>Tollwut</b> <i>Rabipur Tollwutimpfstoff Mérieux</i>  <a href="http://inforeisemedizin.ch/tollwut/">http://inforeisemedizin.ch/tollwut/</a>		<i><b>präexpositionell</b> 2 Dosen (0/ 7 - 28 Tage) bei Bedarf 3. Impfung nach 12 M.  <b>postexpositionell</b> 4 Dosen für ungeimpft Pers. 2 Dosen für geimpfte Pers.</i>	<b>Rab</b>			
<b>Bakt. Hirnhautentzündung</b> Bakt. Meningitis  Menveo  Hadsch  <a href="https://osir.ch/meningitis-bakteriell/">https://osir.ch/meningitis-bakteriell/</a>		<i>ab 2. Geb.tag-6.Geb.tag ab 12.Geb.tag -20Geb.Tag,  alle 5y</i>	<b>Men ACWY</b>			
<b>Japan Encephalitis</b> <i>Ixiaro</i>		<i>ab 36. Mon 2x (0/28d)</i>	<b>JE</b>			Impfupdate2019 9/2019 copyright OSIR

Reise LINKS finden Sie unter <https://osir.ch/wp-content/uploads/LINKS1-rm18052019fuerreisende-1.pdf>

Weitere Informationen über Impfungen finden Sie unter <https://osir.ch/impfungen/>