

| BASIS<br>Impfungen   |   | Empfehlungen<br>Bundesamt<br>für Gesundheit Bern   | Anzahl<br>Impfungen im<br>Impfbüchlein | Impfempfehlung<br>ja / nein | wirksam bis |
|--|---|--|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Kinderlähmung Polio</b><br>Poliorix Revaxis, Boostrix-Polio<br>Infanrix Tetravac Pentavac<br>( Poloral PolioSalk) | IPV dTIPV dTpaIPV<br>DTPaIPV DTPaIPV Hib<br>(OPV) | (3) - 5x<br>Anzahl variabel gemäss<br>Tab 4 BAG Impf Plan<br>in der CH: maximal 5x   |  |                             |             |
| <b>Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus</b><br>Boostrix <b>Td pur</b><br>Revaxis Infanrix (Tetanol)<br>Tetravac Pentavac | dTpa dT<br>dTIPV DTPaIPV<br>DTPaIPV Hib Hib       | 2 Mon-30.Geb tag (3)- 7x<br>Booster:Tab 4 +3 Impf Plan BAG<br>Booster 30-65y: alle 20y                                     |  |                             |             |
| <b>Masern Mumps Röteln-II</b><br>Priorix <b>MMR</b> Vax Pro<br>Moraten Measles Vaccine Erevax                        | MMR   | 2x (12 Mon/ 15Mon )<br>nach 1963 geboren: 2x<br>(0/mind. 4 Wochen)   |  |                             |             |
| <b>Hepatitis B</b><br>Engerix B-20 Vax pro10<br>Infanrix Hexa  | HBV<br>DTPaIPV Hib HBV                            | bis 16.Geb.tag 2x (0/6-12Mon.)<br>ab 16.Geb.tag 3x (0/1/6 Mon.)<br>4 x 2.Mon- 3.Geb.tag                                    |  |                             |             |
| <b>FSME</b><br>EncepurN EncepurNKinder<br>FSME-immunCC FSME Imm.jun  | FSME  | ab 12.Geb.tag 3x / 1.-12.Geb.tag 3x<br>ab 16.Geb.tag 3x / 1.-16.-Geb.tag 3x<br>Booster alle 10y                            |  |                             |             |
| <b>HPV</b><br>Gardasil Cervarix  | HPV   | 11.-15.Geb.tag 2x<br>0   6 Mon.<br>15.- 27.Geb.tag 3x<br>0   1-2 Mon.   6 Mon  |  |                             |             |
| <b>Varizellen</b><br>Varilrix Varivax Priorix Tetra  | VZV   | ab 12Mon. 2x<br>11y -39y 2x  |  |                             |             |
| <b>Meningitis C</b> Menjugate,<br>Meningetec Neis Vacc   | MCV C   | 12-15Mon (-5y)<br>11-15y (-19y)  |  |                             |             |
| <b>Pneumokokken</b> Prevenar 13  | PCV   | 2-12Mon.(-5y)<br>2Mon 4Mon 12Mon<br>bis 5y; Adulte: in spez. Situat.   |  |                             |             |
| <b>Gelbfieber</b> <i>Stamaril</i><br>gewisse Länder in Afrika/Südamerika<br>autorisierte Gelbfieberimpfstelle        | <b>R E I S E<br/>I M P F<br/>U N G E N</b>        | ab 9 Mon. 1x<br>max. 2x,<br>dann Exemption Certificate   |  |                             |             |
| <b>Hepatitis A</b> Havrix 1440<br>Havrix 720   | HAV   | ab 19.Geb.tag 2x1440 E(0/6-Mon.)<br>1.-19. Geb.tag 2x 720 (0/6Mon.)  |  |                             |             |
| <b>Hep A+B</b> Twinrix 720/20  |   | 1-16.Geb.tag 2x 0/6-12Mon<br>Ab 16.Geb.tag 3 x 0/1/ 6Mon.  |  |                             |             |
| <b>Typhus</b> Vivotif  |   | Tag 1 3 und 5 je1 Kps  |  |                             |             |
| <b>Tollwut</b> Rabipur<br>Tollwutimpfstoff Mérioux   |   | präexp. 2x (0/7 bis 28 Tage)<br>bei Bedarf 3. Impfung nach 12 Mon.<br>postexpos. 4x Dosen (ungeimpft)<br>2 Dosen (geimpft) |  |                             |             |
| <b>Meningitis</b> ACWY Menveo  | Men ACWY  | ab 2y, alle 5y   |  |                             |             |
| <b>Japan Encephalitis</b> Ixiaro   |   | ab 36. Mon 2x (0/28d)  |  |                             |             |